

TIMABIOR

Componenti

Glucosio, sodio cloruro, estratti vegetali standardizzati di:
BUXUS S., CERATOSTIGMA W., OLEA E.

Proprietà

Si riportano di seguito le proprietà dei principi attivi fitoterapici come da relativa letteratura scientifica:

L'estratto di **buxus** svolge azione favorevole nei fibroadenomi mammari.

L'estratto di **ceratostigma** agisce positivamente sui tumori ed esaurimenti fisici.

L'estratto di **olea** è indicato nelle lunghe malattie debilitanti e negli esaurimenti fisici.

Indicazioni

Coadiuvante nel trattamento dei tumori mammari e nel post intervento chirurgico.

Dosaggio

- **Se l'intervento chirurgico si può evitare:** somministrare continuativamente TIMABIOR per via orale 1 volta al giorno in base al peso:

- meno di 5 Kg: 10 gocce;
- da 5 a 10 Kg: 20 gocce;
- oltre i 10 Kg: 30/40 gocce.

Associare PHYTO LIVER polvere (come da scheda).

- **Se l'intervento chirurgico è inevitabile:** somministrare TIMABIOR 2 volte al giorno per via orale in base al peso fino all'intervento e continuare per 2 mesi dopo l'intervento:

- meno di 5 Kg: 10 gocce;
- da 5 a 10 Kg: 20 gocce;
- oltre i 10 Kg: 30/40 gocce.

Associare PRONTOBIOR S il giorno precedente e continuare per 4/5 giorni successivi (come da scheda).

In tutti i casi aggiungere al trattamento NATRUMBIOR o PHYTO LIVER, come da scheda.

AGITARE FORTE PRIMA DI OGNI SOMMINISTRAZIONE

Presentazione

Unità di vendita: flacone da 50 g.

